



MALPIGHI CENTRO DIAGNOSTICO s.r.l Via Italia, 12 Chivasso (TO)	PROFILASSI REAZIONI DA MEZZO DI CONTRASTO	
		Data: 18/03/08
		REV. : 2
		Pagina 1 di 1

PROCEDURE PER LA PROFILASSI DELLE REAZIONI DA MEZZO DI CONTRASTO IODATO

IN CASO DI ACCERTATA DIATESI ALLERGICA IL PAZIENTE DEVE :

- **ASSUMERE DELTACORTENE (PREDNISONE) da 25 mg : 2 cps per os
13 ore prima dell'esame**
- **ASSUMERE DELTACORTENE (PREDNISONE) da 25 mg : 2 cps per os
7 ore prima dell'esame**
- **ASSUMERE DELTACORTENE (PREDNISONE) da 25 mg : 2 cps per os
1 ora prima dell'esame**
- **ASSUMERE CLARITYN (LORATIDINA) : 1 cps per os 1 ora prima dell'esame**

Si consiglia inoltre di assumere un gastroprotettore al mattino, prima dell'esame.

N.B : le indicazioni sopracitate devono essere seguite correttamente, in caso di variazioni alla procedura il medico specialista anestesista potrebbe ritenere non idonea la preparazione e decidere non procedere con la somministrazione del mezzo di contrasto.

Per i pazienti diabetici si ricorda che le dosi di DELTACORTENE dovranno essere dimezzate .

La Direzione Sanitaria